AGROPROTEKT DOO

Nikole Pašića 9
Sombor 25000
Srbija

Telefon: +381 63 326 772
Fax: +381 25 444 905

Uvođenje Global GAP standarda Agroprotekt doo iz Sombora obavlja sledeće delatnosti:Vođenje zaštite biljaEdukacija poljoprivrednih proizvođačaIzvođenje ogledaUpozoravanje na pojavu štetnih organizama u poljoprivrediKlopke za insekteFeromoni u prodajiUvođenje GlobalGAP standardaIzdavačka delatnost VOĐENJE ZAŠTITE BILJA I EDUKACIJAVođenje zaštite bilja i knjige polja za poljoprivredne proizvođače, Agroprotekt doo je vršio kod oko 140 poljoprivrednih gazdinstava u opštinama Sombor, Apatin i Kula. Takođe, Agroprotekt doo je vršio edukaciju poljoprivrednih proizvođača u opštinama Sombor, Apatin, Subotica, Novi Kneževac, Horgoš i Palić, kao i izvođenje ogleda i ispitivanja efikasnosti i doza pojedinih pesticida. Agroupozorenje su stranice koje ne treba da Vas uplaše, nego da Vas upozore na trenutno stanje štetnih organizama u poljoprivrednoj proizvodnji u realnom vremenu! UPOZORENJE NA POJAVU ŠTETNIH ORGANIZAMA U POLJOPRIVREDIZbog veoma toplih perioda koji se javljaju poslednjih godina tokom leta, a sve češće i tokom proleća, optimalno vreme za suzbijanje gusenica se javlja i po mesec dana van uobičajenog roka.

Sve češće se u našim krajevima pojavljuju i leptiri selice iz Mediterana čija pojava je iznenadna i veoma masovna. Zbog svega toga, informacija o pojavi štetnih gusenica postaje neophodna.Usluga upozorenja na pojavu štetnih gusenica je namenjena stručnjacima za zaštitu bilja i proizvođačima ratarskih i povrtarskih kultura. Ona

omogućava da se pregledi biljaka na prisustvo ovih štetočina obavljaju u pravo vreme. Na taj način se i insekticidi mogu nabaviti i koristiti u pravo vreme, čime se planiraju i smanjuju troškovi i povećava efikasnost primene insekticida!KLOPKE ZA INSEKTEVećina insekata je male veličine, a na primer jaja koja bi trebali da pronađemo su jedva vidljiva golim okom. Stoga se za praćenje insekata koriste razni tipovi klopki: Feromonske klopke za insekteObojene klopke za insekteLepljive klopke za insekteBez obzira na to koje klopke se koriste važno je da se one postave na vreme, na mestu gde je vrsta koju želimo da pratimo najbrojnija i da se brojnost očitava redovno. Pravo vreme postavljanja se može odrediti na osnovu sume efektivnih temperatura. Podaci o sumama efektivnih temperatura za Srbiju se mogu pronaći na sajtu AGROUPOZORENJE.FEROMONSKE KLOPKE ZA INSEKTEFeromoni su materije koje obično ispuštaju ženke kako bi ih pronašli mužjaci. Neke vrste osete feromon suprotnog pola na velikim udaljenostima i do nekoliko kilometara. Ipak kod insekata koji mogu biti štetni to je obično nekoliko stotina metara. Feromonske klopke koriste seksualne mirise da bi privukle jedinke neke vrste insekata. Uglavnom su visoko specifične i privlače samo jednu vrstu. Postoje feromonske klopke i za veći broj insekata. Feromon u klopci privlači insekta, on ulazi u klopku u kojoj se zalepi na ploču koja je premazana posebnim lepkom koji se sporo suši. Klopka vrši svoju funkciju samo u periodu dok se oslobađaju feromoni. Najčešće se oni oslobađaju tokom 4 do 6 nedelja. Kraći period je tokom vrućina, a duži period tokom hladnijih perioda.

Na jedno mesto u jedan voćnjak je najbolje postaviti dve klopke za istu vrstu i tada razmak između tih klopki treba da je 15 do 20 metara. Tada je pouzdanost dobijenih podataka za taj voćnjak i tu vrstu veoma velika. Feromonske klopke su veoma osetljive i ukoliko nema ulova insekata ili je ulov jako mali, nema potrebe za zaštitiom, jer će broj oštećenih plodova od te vrste biti jako mali. U tom slučaju treba pažnju obratiti na druge vrste koje mogu biti štetne.

OBOJENE KLOPKE ZA INSEKTEObojene klopke koriste osobinu insekata da ih privlače određene boje. Obično se koriste bele, žute i plave obojene klopke. Ove klopke nisu selektivne i privlače sve insekte koje privlači obojena klopka. Površina klopke je premazana posebnim lepkom koji se sporo suši i na njoj ostaju zalepljeni. Pošto

klopke postavljamo na mesto gde se štetni insekti najviše pojavljuju, najveći broj prikupljenih insekata je ciljana štetočina. Klopka vrši svoju funkciju privlačenja tokom 6 do 8 nedelja (sve dok je lepak lepljiv). Međutim, ako je broj insekata velik, oni nekada u podpunosti prekriju površinu klopke i tada je treba zameniti novom ranije.GLOBAL GAP STANDARDGlobalG.A.P. standard je svetski standard koji predstavlja proizvodnju po principima Dobre poljoprivredne prakse (Good Agricultur Practice). Prema tom standardu ustanovljene su kritične tačke proizvodnje čijom kontrolom se garantuje krajnjem kupcu da je proizvod koga jede zdravstveno bezbedan, da je higijenski ispravan i da je prilikom njegove proizvodnje vođeno računa o životnoj sredini.Proizvođači u Evropi i svetu se godinama prilagođavaju ovom standardu. Pitanje je dana kada će ovaj standard postati obaveza i kod nas. Agroprotekt doo Vam može pomoći da Vašu primarnu poljoprivrednu proizvodnju uskladite sa standardom GlobalG.A.P.KONTAKTNikole Pašića 9
25000 SomborTel/fax: +381 25 444 905Direktor
dr Dragan Vajgand
Mob: +381 63 326 772

Pošalji prijatelju